EROESSA CHILENSIS GUER., GENERO Y ESPECIE NUEVOS PARA LA REPUBLICA ARGENTINA

(*Lep. Pieridae*)

por

ALBERTO BREYER

En trabajos anteriores (Rev. Soc. Ent. Arg. tomo VIII, pág. 61, Rev. Arg. de Zoog., Vol. I, N.º 2, pág. 129) hemos mencionado, que considerábamos las altas cadenas de la Cordillera de los Andes, división infranqueable para la lepidopterofauna argentina y chilena desde el valle de Uspallata hacia el Norte, mientras que en la parte del Sur comprobamos que los lepidópteros típicos de Chile pasan al territorio argentino en el sector cordillerano comprendido entre Bariloche (borde Sur del lago Nahuel Huapí) hasta el Correntoso (punta Norte del mismo lago). Entre el Correntoso y el Valle de Uspallata nada podíamos afirmar al respecto por falta de datos de observación.

Hoy sin embargo, y gracias a un muy interesante y feliz hallazgo, podemos agregar, que la continuidad de la fauna chilena hacia nuestro territorio llega por lo pronto desde Bariloche hasta San Martín de los Andes.

En efecto, nuestro inteligente consocio, el R. P. A. J. Bridaroli nos obsequió con un ejemplar de *Eröessa chilensis* Guér. (único que capturó de esta especie) y que coleccionó en el valle del Arroyo Pil-Pil, cerca del Lago Lacar, próximo a la localidad de San Martín de los Andes, a una altura de unos 500 metros sobre el nivel del mar, el 27 de enero de 1941, aproximadamente a la hora 10, una mañana desnublada y bastante calurosa.

Pero aparte de la mencionada comprobación interesante, nos encontramos en presencia de un ejemplar muy particular y bastante raro.

Edwyn C. Reed en su "Monografía de las Mariposas de Chile" (An. Univ. de Chile, entrega de septiembre de 1877) dice al respecto de *Eröessa chilensis* Guér.: "Creo que no existen más de 2 ejemplares de esta especie en colecciones..."

Seitz en su gran obra, pág. 96 dice al respecto:

"Este género *(Eröessa)*, es emparentado con los paleárticos y norteamericanos de *Euchloë* y *Anthocharis*... La única especie de este género habita las altas sierras de Chile... Parece ser rara y aparecer en zonas muy locales".

El dibujo que Seitz dá en la lámina 28 es bastante acertado, si bien la mancha amarillenta en nuestro ejemplar es de tamaño algo mayor y de color más subido de tono. También los dibujos del lado inferior del ala posterior son más intensos en color y un poco más extendidos.

El último autor que se refiere a este género es el Dr. Emilio Ureta R. en su publicación "Lepidópteros de Chile", parte III, de mayo de 1939 aparecido en la Rev. Chil. de Hist. Nat., en la cual a la vez de dar la descripción original de Guérin, hace una redescripción minuciosa de ambos sexos, dando a la vez láminas en colores muy bien acertadas.

Crea una forma nueva que llama *"Eröessa chilensis* f. *oyarzuni"*.

Nuestro ejemplar difiere levemente en intensidad de colorido y en otros pequeños detalles, de manera que lo enviaremos al mencionado especialista para su exacta revisación.

Hace recalcar este autor, que se trata de una especie propia de la costa del mar y de baja altura sobre el nivel de éste. Pone en duda la cita de Wagenknecht de haberla encontrado a 1470 metros de altura, pero nuestra presentación fijaría una altura media entre estas observaciones.

Agrega Ureta que ha hecho sus observaciones sobre 53 ejemplares.